

NOTAS SOBRE LA FLORA DE LAS SIERRAS DE CAZORLA Y SEGURA

Bolet. Inst. Cent. Acad., 1975
Vol. 4 (7): 27-33

CARLOS SORIANO MARTIN
y JOSE LUIS GONZALEZ REBOLLAR

CATEDRA DE BOTANICA DE LA ESCUELA
TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE MONTES

En estas notas concretamos localidades de algunas de las especies que hemos herborizado en el macizo de Cazorla-Segura, dando sus coordenadas U. T. M. en cuadrícula de un kilómetro de lado.

Todas las citas corresponden al huso 30 S.

Cuando no se especifica el nombre del recolector, la cita corresponde a los firmantes de este trabajo, pues se han agregado algunas localidades de especies recogidas por J. Ruiz de la Torre y J. F. Muñoz Garmendia.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman.—Torca al NNE del Pico de Cabañas, próxima a la cumbre, en lugares en que se acumula la nieve. WG.04.85, recolectada el 4-6-75 y 20-6-75.

Celtis australis L.—Karst en la solana de Cagasebo, junto al camino forestal de la Sierra del Pozo, a 1.600 m. alt. WG.02.82 Ruiz de la Torre y Muñoz Garmendia, 26-6-75. En este karst la atactofitia nos muestra entremezclados abundantes tejos, arces, *Cotoneaster*, *Lonicera arborea*, *Lon. splendida*, etc., con higueras (*Ficus*) y almeces (*Celtis*), todo ello fuertemente recomido por la cabra montés.

Aristolochia pistolochia L.—Muy frecuente en el sotobosque de pinares y encinares. Fuente del Oso: WG.05.95, rec. el 3-6-75.

Aristolochia longa L.—Frecuente en la Sierra. Fuente del Oso: WG.05.95, 3-6-75.

Ribes petraeum Wulfen.—Karst de la solana de Cagasebo, junto al camino forestal de la Sierra del Pozo, 1.660 m. alt., WG.02.82. Ruiz de la Torre y Muñoz Garmendia, 26-6-75.

Cotoneaster granatensis Boiss.—Karst de la solana de Cagasebo, junto al camino forestal de la Sierra del Pozo, 1.660 m. alt., WG.02.82, Ruiz de la Torre y Muñoz Garmendia, 26-6-75.

Colutea atlantica Browicz.—Cortijo de la Cerrada, WH.21.21, rec. el 21-6-75.

Coronilla juncea L.—Cortijo de la Cerrada, WH.21.21, Soriano y González Rebollar, 10-5-75.

Sierra del Pozo, Tíscar, Puerto de Tíscar y Sierra de Quesada: WG.00.77, WG.00.78, VG.99.79, VG.98.79, VG.98.80, VG.96.82, VG.95.83 y VG.95.84. Ruiz de la Torre y Muñoz Garmendia, 25 y 26-6-75.

Rhamnus alaternus L.—Arroyo de Bujaraiza, procedente de La Cabañuela. WH.17.19, rec. el 22-6-75.

Frangula alnus Mill.—Arroyo de Bujaraiza de La Cabañuela. WH.17.19, rec. el 17-6-75.

Cistus populifolius L.—Terraza del Guadalquivir, a la altura de la Fuente del Tobazo, WH.11.08 y Cerro del Espartal, WH.19.16. Soriano y González Rebollar, 21-6-75.

Sierra del Pozo, sobre la carretera de Quesada, WG.00.78. Ruiz de la Torre, 25-6-75.

Cornus sanguinea L.—Camino del Cantalar, antes de los cortijos de Collado Verde, WH.07.01, rec. el 20-6-75.

Arroyo de Bujaraiza a La Cabañuela, WH.17.19, rec. el 22-6-75.

Erica scoparia L.—Parte baja de la ladera Norte del Cerro del Espartal, junto con *Cistus ladaniifolius* y *Erica arborea*, sobre margas arcillosas tridásicas. WH.19.16, rec. el 18-6-75.

Bellardia trixago (L.) All.—Camino de entrada a la piscifactoría del alto Guadalquivir. Margas yesíferas. WH.11.07, rec. el 21-6-75.

Camino del Cantalar, antes de los Cortijos de Collado Verde, WH.07.01. rec. el 20-6-75.

Pinguicula vallisnerifolia Webb.—Barranco del Guadalentín, WG.14.95.

Cytinus hypocistis L.—Faldas del Cerro de La Laguna, sobre *Fumana ericoides*. Ruiz de la Torre, Soriano, González Rebollar y Muñoz Garmendia. WG.02.94, rec. el 23-6-75.

Pallenis spinosa (L.) Cass.—Fuente del Oso, WG.05.95, rec. 20-6-75. Soriano y González Rebollar. Cortijo de La Cerrada, WH.21.21, rec. 21-6-75. Soriano y González Rebollar.

Camino de entrada a la piscifactoría, sobre margas yesíferas, WH.11.07, rec. 21-6-75. Soriano y González Rebollar.

Valle del Guadalquivir, entre Guadahornillos y la Torre del Vinagre, WH.10.06 y WH.08.05. Ruiz de la Torre, 27-6-75.

Puerto de las Palomas, WH.05.00, Ruiz de la Torre, 28-6-75.

Arrhenatherum elatius (L.) Roem. & Schult. Abundante en toda la serranía.

Arundo donax L.—Arroyo de Las Grajas. Borde del camino. WH.16.13, rec. el 17-6-75.

Arundo plinii Turra.—Sierra del Pozo, junto a la carretera de Quesada, WG.01.76 y WG.01.77, sobre margas arcillosas. Ruiz de la Torre, 25-6-75.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce.—Ladera Este del Cerro de La Laguna, WG.03.95, rec. 23-6-75.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.—Barranco de Bujaraiza de La Cabañuela. Borde del Arroyo. WH.17.19, rec. 17-6-75.

Ladera Norte del Cerro del Espartal, al borde de la carretera, WH.19.16, rec. 9-5-75.

Neotinea intacta (Link) Rchb.—Fuente del Oso, WG.05.95, rec. 6-5-75.

Orchis mascula L.—Ladera Este del Caballo de Acero. Sotobosque de *Quercus faginea*. WG.14.94, rec. 5-6-75.

Orchis coriophora L.—Bastante frecuente en las sierras, en cunetas y lugares húmedos.

Camino de entrada a la piscifactoría, sobre margas yesíferas. WH.11.07, rec. 21-6-75.

Arroyo de Bujaraiza de La Cabañuela, WH.17.19, rec. 17-6-75.

Entorno del kilómetro 1 de la Carretera del Tranco, WG.04.97, rec. 20-6-75.

Camino del Cantalar, antes de llegar a los cortijos de Collado Verde, WH.07.01, rec. el 20-6-75.

Ophrys apifera Huds.—Arroyo de Bujaraiza de La Cabañuela, WH.17.19, rec. 17-6-75.

Camino del Cantalar, WH.07.01, rec. 20-6-75.

Entorno del kilómetro 1 de la carretera del Tranco, WG.04.97, rec. 20-6-75.

Camino de entrada a la piscifactoría, WH.11.07, rec. 21-6-75.

Ophrys fusca Link.—Cerro de las Canasteras. Pinar de *P. halepensis*. WH.21.21, rec. 18-4-75.

Fuente del Oso, WG.05.95, rec. 6-5-75.

El Calerón, WG.04.94, rec. 8-5-75.

Ophrys lutea Cav.—Fuente del Oso, WG.05.95, rec. 6-5-75.

Cerro de las Canasteras, WH.21.21, rec. 18-4-75.

Entorno del kilómetro 9 de la carretera de Cazorla a Vadillo, WG.04.97, rec. 6-5-75.

Ophrys scolopax Cav.—Cortijo de la Cerrada, WH.21.21, rec. 21-6-75.

Ophrys speculum Link.—Cerro de las Canasteras, WH.21.21, rec. 18-4-75.

Borde de la pista forestal de Aguasmulas (Casa de Las Tablas), WH.16.11, rec. 10-5-75.

Ophrys sphegodes Mill.—Cortijo de Las Animas, WH.17.15, rec. 7-5-75.

Platanthera chlorantha (Custer). Rchb.—Camino del Cantalar, antes de llegar a los Cortijos de Collado Verde, en lugares muy húmedos. WH.07.01, rec. 20-6-75.

R E S U M E N

Se dan localidades de algunas especies presentes en las sierras de Cazorla y Segura, precisando la situación en coordenadas U. T. M., en cuadrícula de un kilómetro de lado.

S U M M A R Y

Localities of some species present in Sierras of Segura and Cazorla are given, fixing their situation in coordinates U. T. M, in quadrates of 1 Km × 1 Km.